

[Encontrar Total F Suspensión en Colombia](#)



[](#)

[Encontrar Total F LC Comprimidos Palatables para perros](#)



[](#)

[Encontrar Total F LC Comprimidos Palatables para gatos](#)



Patrocinado por:



Pirantel

- El **pirantel** en general es un fármaco activo contra parásitos nemátodos en diferentes especies.
- Ha sido utilizado para la eliminación de nemátodos en **perros, como: Ascaris (toxocaros canis, T. leonina), Trichuris spp, Ancylostoma caninum, Uncinaria Stemcephala y nemátodos gástricos (Physaloptera)**
. Su uso en gatos es seguro.
- El **pirantel** esta indicado (autorizado) para la eliminación de los siguientes parásitos en los caballos: Strongylus vulgaris y equinus Parascaris equorum y Probstymayria vivapara. Tiene actividad variable contra Oxyuris equis, S. edentatus y pequeños estrombilos.
- Aunque parece no haber productos con pirantel aprobados para uso en **bovinos**, ovinos, caprinos, la droga es efectiva (como tartrato) para la eliminación de los siguientes parásitos: Haemonchus spp. , Ostertagia spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Chabertia spp, Cooperia spp y Oesophangostomum spp.
- Por lo general se combina con praziquantel para ofrecer actividad cestocida, aunque también puede encontrarse en presentaciones comerciales con febantel, oxantel, entre otros.
- El **tartrato de pirantel** esta indicado (autorizado) para la eliminación o prevención de los siguientes parásitos en porcinos: grandes gusanos redondos (**áscaris suum**)
y
Oesophagostomum spp
.

- La droga tiene actividad contra los **gusanos gástricos del cerdo (Hyostrongylus rubdus)**
- El pirantel actúa como un bloqueante neuromuscular despolarizante en parásitos susceptibles. La droga posee propiedades nicotínicas y actúa en forma similar a la **acetilcolina**
. También inhibe la **colinesterasa**
.

- Especies en las que puede ser utilizado el **pirantel**:

- **Caninos**: 5-15 mg/Kg PO (per os, o vía oral). Se recomienda repetir a las dos semanas.

Puede ser utilizado en cachorros desde las 3 semanas de edad

- **Felinos**: 5-10 mg/Kg PO con repetición a los 15 días. Pueden ser tratados gatitos desde las 3 semanas de edad

- **Conejos/roedores/pequeños mamíferos**: 10-15 mg/Kg PO y repetir a los 15 días

- **Equinos**: 12.5 mg/Kg PO

- **Porcinos**: 22 mg/Kg PO

- **Bovinos/ovinos/caprinos**: 25 mg/Kg PO